




Recommended Measures

המלצות למטייל הישראלי

התפשטות התפרצות קדחת צהובה בדרום מזרח ברזיל, 7/2/17

החל מסוף ינואר 2017 מדווחות רשויות הבריאות של ברזיל על עליה פי חמש במספר חולי קדחת צהובה (sylvatic transmission), הרוב המכריע במחוז הכפרי Minas Gerais בדרום מזרח ברזיל. בנוסף, המחלה התפשטה במחוזות Espírito Santo ו-São Paulo (הגובלים עם Minas Gerais) אשר נחשבו חופשיים ממחלה בבני האדם עד כה (ראה מפה). כמו כן בודקים מקרים חשודים במחלה במחוז Bahia.

מפה של אזורים אנדמיים לקדחת צהובה לפי מחוזות ולפי זמן, PAHO 2.2.17





התפלגות חולים (מאושרים או חשודים) ופטירות בהתפרצות קדחת צהובה בדרום מזרח ברזיל לפי מחוזות,

מעודכן ל- 2.2.17 על פי PAHO

מחוז/מס' חולים מאושרים או חשודים	Minas Gerais	Espírito Santo	São Paulo	סה"כ	שיעור קטלניות
מס' חולים מאושרים	134	13	4	151	36%
מס' חולים חשודים	668	54	3	725	12%
מס' פטירות בין החולים המאושרים	48	3	3	54	16%

קדחת צהובה בבעלי חיים:

דווח על 412 התפרצויות בקרב בעלי חיים (Non Human Primates), מהם מתו 1,202. ב- 259 מהם אושרה קדחת צהובה.

המלצות לנוסעים לברזיל:

1. כל המחוז Minas Gerais הינו אזור אנדמי לקדחת צהובה ומשרד הבריאות ממשיך להמליץ למגיעים למחוז זה להיות מחוסנים נגד קדחת צהובה.

2. ארגון הבריאות העולמי מרחיב את האזורים שלנוסעים אליהם מומלץ להתחסן נגד קדחת צהובה כדלקמן:

WHO: Areas at risk for yellow fever transmission in Brazil, 2013–2017:

- a. **Espírito Santo** State: at risk for yellow fever transmission with the exception of the urban area of Vitoria;



- b. **Rio de Janeiro** State: at risk for yellow fever transmission in the following northern municipalities bordering Minas Gerais and Espírito Santo States: Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Cardoso Moreira; Italva; Itaperuna; Laje do Muriae; Miracema; Natividade; Porciuncula; Santo Antonio de Padua; São Fidelis; São Jose de Uba; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; São Francisco de Itabapoa; São João da Barra;
- c. **Bahia** State: extension of the areas at risk for yellow fever transmission with the inclusion of the following municipalities in the south and south-west of the States: Alcobasa; Belmonte; Canavieiras; Caravelas; Ilheus; Itacare; Mucuri; Nova Visosa; Porto Seguro; Prado; Santa Cruz Cabralia; Una; Urucuca; Almadina; Anage; Arataca; Barra do Chosa; Barro Preto; Belo Campo; Buerarema; Caatiba; Camacan; Candido Sales; Coaraci; CondeUba; Cordeiros; Encruzilhada; Eunapolis; Firmino Alves; Floresta Azul; Guaratinga; Ibicarai; Ibicui; Ibirapua; Itabela; Itabuna; Itagimirim; Itaju do Colonia; Itajupe; Itamaraju; Itambe; Itanhem; Itape; Itapebi; Itapetinga; Itapitanga; Itarantim; Itororo; Jucurusu; Jussari; Lajedao; Macarani; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Nova Canaa; Pau Brasil; Piripa; Planalto; Posoes; Potiragua; Ribeirao do Largo; Santa Cruz da Vitoria; Santa Luzia; São Jose da Vitoria; Teixeira de Freitas; Tremedal; Vereda; Vitoria da Conquista.

3. לגבי שאר המחוזות שבהם קיימת תחלואה בקדחת צהובה (האזורים האדומים במפה המצורפת), יש לפעול על פי ההנחיות הקיימות.

4. להזכירכם, יש להשתמש באמצעים לצמצום הסיכון לעקיצת יתושים, בעיקר בשעות היום וגם בשעות הלילה:

א. מריחה של חומר דוחה יתושים.

ב. לבוש ארוך: חולצה עם שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים, גרביים וכובע.

ג. לינה בחדרים מוגנים מפני יתושים: רשתות תקינות וסגורות בחלונות ובדלתות, או חדר סגור ממוזג או תחת כילה מרוססת בקוטל יתושים.

אמצעים אלה מבטיחים הגנה חלקית מעקיצות יתושים.