

חוזר מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות



משרד הבריאות

כ"ו תשרי תשע"ד
30 ספטמבר 2013
מס': 01/13
54199613

אל: מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהלי בתי החולים הכלליים

הנושא: טיפולים כימותרפיים בילדים לממאירויות הייחודיות בילדים סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס' 22/11 מיום 19 ביוני 2011

בהמשך לחוזר שבסימוכין, להלן פירוט הפרוטוקולים הכימותרפיים בילדים כפי שהוכנו ע"י האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים (נספח 1 לחוזר זה).

1. באחריות כל מרכז רפואי לרכז את הנתונים לגבי החולים המטופלים בהתאם לחוזר זה.
2. את הנתונים יש להעביר, אחת לחצי שנה (ב-1 באוגוסט לגבי החציון הראשון של השנה וב-1 בפברואר לגבי החציון השני של השנה).
3. הדו"ח יוגש בפורמט המצורף בזאת (נספח 2 לחוזר זה).
4. את הדו"ח יש להעביר הן ליו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים והן לראש מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות (רח' ירמיהו 39 ירושלים, או בפקס – 02-6474843).

הנחיות אלו יתעדכנו מעת לעת.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב,

ד"ר אסנת לוקסנבורג

העתק : שרת הבריאות
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה – מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
רכז בריאות, אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית
יו"ר מועצה מדעית - ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל

נספח 1

| שם התכשיר | התוויה מפורטת | שם הפרוטוקול הבינ"ל | הערות |
|------------------|--|--|--|
| Irinotecan | נירובלסטומה - פרוטוקול הישנות לאחר טיפול קו ראשון או שני | Children with recurrent neuroblastoma ANBL 0421 Children's Oncology group | הפסקת טיפול לאחר 3 חודשים במידה ויש התקדמות במחלה |
| Temozolomide | נירובלסטומה - פרוטוקול הישנות לאחר טיפול קו ראשון או שני | ANBL 0421 Children's Oncology group Children with recurrent neuroblastoma | הפסקת טיפול אחר 3 חודשים אם יש התקדמות במחלה |
| Topotecan | נירובלסטומה - פרוטוקול הישנות לאחר טיפול קו ראשון או שני | Children with recurrent neuroblastoma POG 9464 | הטיפול ניתן יחד עם ציטוקסן . הפסקת טיפול לאחר 3 חודשים במידה ויש התקדמות במחלה |
| Topotecan | הישנות ראשונה או שניה Ewing Sarcoma אחר | POG 9464 Children with recurrent Ewing sarcoma | הטיפול ניתן יחד עם ציטוקסן . הפסקת טיפול לאחר 3 חודשים במידה ויש התקדמות במחלה |
| Irinotecan | Ewing Sarcoma בהישנות ראשונה או שניה | Relapse Ewing protocol MSKCC | ייתן יחד עם Temozolomide |
| Temozolomide | Ewing Sarcoma בהישנות ראשונה או שניה | MSKCC Relapse Ewing\sarcoma | ייתן ביחד עם Irinotecan |
| Vinorelbine | הישנות Hodgkin בילדים | Relapse in children with Hodgkin's disease AHOPD0321 COG | הטיפול יינתן ביחד עם Ifosfamide או Gemcitabine |
| Gemcitabine | הישנות Hodgkin בילדים | Relapse in children with Hodgkin's AHOPD0321 COG | הטיפול יינתן יחד עם Vinorelbine |
| Vinorelbine | Rhabdomyosarcoma | Rhabdomyosarcoma protocol in children EpSSG 2005 בדרגת פרוטוקול אירופאי בילדים סיכון גבוה ו/או גרורתי | הטיפול יינתן יחד עם ציטוקסאן במתן פומי |
| PEG Asparaginase | ALL | AIEOP-BFM ALL 2009 International collaborative treatment protocol for children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia | ככלל התרופה תנופק על ידי קופות החולים. (רק בחלק בפרוטוקול הטיפול בו יש רנדומיזציה עבור חלק מהחולים, תסופק התרופה על ידי בעל הרישום, ישירות למרכזים הרפואיים, עבור החולים הספציפיים שמית) |

| הערות | שם הפרוטוקול הבינ"ל | התוויה מפורטת | שם התכשיר |
|-------|---------------------------|---|------------|
| | Refractory AIHA treatment | Pediatric Autoimmune Hemolytic Anemia | Rituximab |
| | Memorial Sloan-Kettering | הישנות רבדומיוסרקומה | Irinotecan |
| | Memorial Sloan-Kettering | הישנות רבדומיוסרקומה | Temodal |
| | POG 9464 | הישנות רבדומיוסרקומה | Topotecan |
| | AIEOP-BFM ALL 2009 | ALL – חולים בסיכון גבוה במיוחד | Daunoxome |
| | | הישנות AML | Daunoxome |
| | SIOPEN HRNBL-1 | נירובלסטומה – חולים בסיכון גבוה | Proluekin |
| | | בדיקה מולקולרית ו-FISH בתאי גידול לקביעת טיפול בסרקומות | |

טופס דיווח

טיפולים כימותרפיים בילדים

עבור התקופה:

_____ **חציון ראשון של שנת**
(חודשים: ינואר – יוני)

_____ **חציון שני של שנת**
(חודשים: יולי – דצמבר)

_____ שם המוסד/המכון:

_____ שם מנהל המכון:

_____ שם ממלא השאלון:

_____ תפקיד ממלא השאלון:

_____ **טלפון:**

_____ **דוא"ל:**

כתובת למשלוח הטופס:

בדואר –

1. יו"ר האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים, פרופ' איציק יניב

2. ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות, משרד הבריאות, רח' ירמיהו 39,

ת.ד. 1176 ירושלים 9101002

יש למלא את הטבלה הבאה לגבי הטיפולים הכימותרפיים בילדים המבוצעים במכוןך:

| הערות | מספר מטופלים חצי שנתי | | | התוויה | שם התרופה |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------|---|------------------|
| | סה"כ | גיל 10 שנים ומעלה | עד גיל 10 שנים | | |
| | | | | Neuroblastoma בהישנות ראשונה או שניה | Irinotecan |
| | | | | Neuroblastoma בהישנות ראשונה או שניה | Temozolomide |
| | | | | Neuroblastoma בהישנות ראשונה או שניה | Topotecan |
| | | | | Ewing Sarcoma בהישנות ראשונה או שניה | Irinotecan |
| | | | | Ewing Sarcoma בהישנות ראשונה או שניה | Temozolomide |
| | | | | Ewing Sarcoma בהישנות ראשונה או שניה | Topotecan |
| | | | | Rhabdomyosarcoma | Vinorelbine |
| | | | | Hodgkin בילדים | Gemcitabine |
| | | | | Hodgkin בילדים | Vinorelbine |
| | | | | ALL | PEG Asparaginase |
| | | | | AIHA (Autoimmune hemolytic anemia) | Rituximab |
| | | | | Rhabdomyosarcoma הישנות | Irinotecan |
| | | | | Rhabdomyosarcoma הישנות | Temodal |
| | | | | Rhabdomyosarcoma הישנות | Topotecan |
| | | | | ALL – חולים בסיכון גבוה במיוחד | Daunoxome |
| | | | | AML הישנות | Daunoxome |
| | | | | Neuroblastoma חולים בסיכון גבוה | Proluekin |
| | | | | בדיקה מולקולרית ו-FISH בתאי גידול לקביעת טיפול בסרקומות | |

הערות:

תודה על שיתוף הפעולה