

שרותי אשפוז

חוזר מס' 8/87

ירושלים, כה' טבת התשמ"ז
26 ינואר 1987

תיק מס' 2/1/14

אל: מנהלי בתי החולים הכלליים (מח' נשים ויולדות) _____
מנהלי בית החולים ליולדות _____

הנדון: הפסקת הריון בשליש השני להריון -
הזרקה תוך-רחמית של פרוסטגלנדינים

בעקבות אירוע טרגי בו התפתחה תמונה של הפרת הריון בגינת.ס., לאחר הפסקת הריון
בשיטת BOERO על-ידי הזרקה מי מלח ברגי. על כן הוחלט להוציא נושא השיטה
המועדפת להפסקת הריון בשליש השני להריון לרשות המייעצת לגינקולוגיה
ומיילדות שליד מנכ"ל משרדנו.

בהתאם להמלצתה, יש להפסיק הזרקה תוך רחמית של פרוסטגלנדינים על גרימת הפלה על-ידי
הזרקה תוך רחמית. תמיכה היפרטונית. זאת, הואיל וידוע שהשיטה השניה גורמת
לשכיחות גבוהה יותר של המעקרישה, ובמקרים נדירים אף עלולה לגרום לנזק אנטומי
וטיפקודי לתאי המוח.

הואילו להביא לידיעת רופאי הנשים במוסדכם כי יש לנהוג בהתאם להנחיה זו בהפסקת
הריון בשליש השני להריון.

בכבוד רב,

ד"ר מ. משיח
ראש שירותי אשפוז

העתק: למנהל הכללי
לועדה המייעצה לגינקולוגיה ומיילדות (לידי פרופ' י. אינסלר המרכז הרפואי
סורוקה, באר שבע)